

# ECOLAB Spitaderm - preparat do odkażania rąk i skóry 500ml

\*



Cena: 23,60 pln

## Opis słownikowy

Producent	ECOLAB
Produkt leczniczy	Forma transportu - POLTRAF
Rejestracja	Produkt leczniczy

## Opis produktu

*Produkt dostępny w ofercie apteki, a zamówienie towaru możliwe na zasadach przedpłaty na konto z odbiorem w naszym lub za pośrednictwem apteki internetowej aptekadlapacjenta.pl. Podmiot leczniczy nie może nabywać produktów leczniczych drogą wysyłkową.*

Spitaderm - preparat do odkażania rąk i skóry 500ml

## Właściwości:

Spitaderm jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej. W niniejszym produkcie

zastosowane substancje czynne: izopropanol, diglukonian chlorheksydyny oraz nadtlenek wodoru wzajemnie uzupełniają swój zakres działania, zapewniając szerokie spektrum działania.

Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze drobnoustrojom: bakteriom (włącznie z prątkiem gruźlicy), grzybom i wirusom (HBV, HIV). Skuteczność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV) została potwierdzona testem MADT (ang. morphological alteration and disintegration test).

Preparat jest autosterylny (Patent Europejski nr 0016319). Nadtlenek wodoru gwarantuje, że preparat jest wolny do przetrwalników przy produkcji, przelewaniu i napełnianiu. Zawarty w preparacie nadtlenek wodoru niszczy przetrwalniki bakterii, które mogą się dostać ponownie do roztworu.

#### Obszar zastosowań:

- ręce - TAK

- skóra przed punkcjami, iniekcjami, operacjami - TAK
- substancje pielęgnujące - TAK
- H5N1, A/H1N1 - TAK
- rotawirusy - TAK
- HBV, HCV, HIV - TAK

Pojemność: 500ml.

Opcjonalnie można dokupić uchwyt do butelki Manisoft.

**Sposób użycia:**

Preparat tylko do użytku zewnętrznego.

- Chirurgiczne odkażanie rąk:

Przynajmniej 5 ml preparatu wcierać w dłonie i przedramiona w czasie 1,5 min. Czynność należy powtórzyć. Dłonie powinny pozostawać wilgotne podczas odkażania.

- Higieniczne odkażanie rąk:

Wcierać 3 ml preparatu w czasie 30 sek.

- Odkażanie skóry przed iniekcjami:

Skórę poddać działaniu preparatu w czasie 15 sek.

- Odkażanie skóry przed punkcjami, operacjami:

Skórę poddać działaniu preparatu w czasie 1 min.

**Skład:**

100 g roztworu zawiera:

Substancja czynna:

70 g izopropanolu,  
0,5 g diglukonianu chlorheksydyne,  
1,5 g 30% roztwór nadtlenku wodoru.

Substancje pomocnicze:

makrogolo-6-glicerolu kaprylokapronian, substancja zapachowa



Produkty lecznicze, mogą być przewożone wyłącznie w warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa tj. w bezpiecznej temperaturze pokojowej 15-25°C. Dostawę w takich warunkach gwarantuje specjalistyczna firma kurierska POLTRAF Sp. z o.o. grupa UPS dysponująca profesjonalną flotą samochodów dostawczych z klimatyzowaną/ogrzewaną przestrzenią bagażową zapewniającą bezpieczny transport towarów wymagających kontroli temperatury bez względu na warunki atmosferyczne (upał czy mróz) w szczególności leków.



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.