

Naranyl Spray przyspieszający gojenie ran - 50ml

Cena: 23,70 pln



Opis słownikowy

| | |
|-------------|----------------|
| Pojemność | 50ml |
| Producent | Novascon |
| Rejestracja | Wyrób medyczny |

Opis produktu

Wyrób medyczny NARANYL spray to preparat o działaniu antybakteryjnym i antyseptycznym, przeznaczonym do stosowania wspomagająco w leczeniu uszkodzeń skóry hamując niewielkie krwawienia, dezynfekując i zapobiegając zakażeniu.

Produkt dzięki zawartości gliceryny, nawilża i osłania naskórek, dodatkowo poprzez delikatne schłodzenie i nawilżenie zranionego miejsca pielęgnuje podrażnioną skórę i zmniejsza odczuwanie bólu. Spray tworzy na powierzchni skóry ochronny film zapobiegający negatywnemu działaniu czynników zewnętrznych i wpływający na przyspiesza gojenia.

Innowacyjny składnik preparatu, jakim jest chitozan to organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów, powstający w wyniku deacetylacji chityny i tworzący na powierzchni skóry warstwę ochronną, zapobiegającą wnikaniu drobnoustrojów - chroniąc przed zakażeniem oraz stymulując proces regeneracji skóry, zapewniając jednocześnie skuteczną absorpcję wysięku i hamując krwawienie.

Spray zawiera w swoim składzie srebro koloidalne zapewniające silne właściwości antybakteryjne i antyseptyczne oraz kwas hialuronowy (występuje powszechnie w wielu tkankach ciała), który pełni rolę podpory strukturalnej, zapewniając napięcie, odżywienie i elastyczność tkanek oraz wspomagający i przyspieszający proces regeneracji naskórka.

Wskazania:

Wspomagająco w leczeniu drobnych ran (skaleczenia, zadrapania, pęknięcia skóry, otarcia), w oparzeniach I stopnia.

Sposób użycia i dawkowanie:

Przed każdym użyciem wstrząsnąć kilkukrotnie buteleczkę. Przed pierwszym użyciem kilkukrotnie nacisnąć dozownik, aby wypętnić go płynem.

Skierować aplikator w kierunku uszkodzonej skóry i z odległości ok 10 cm spryskać skórę w zależności od potrzeby.

Spray można także stosować pośrednio poprzez nawilżenie preparatem wacika i przecieranie zranionego miejsca.

Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki w zależności od potrzeb.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie wyrobu medycznego jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Stosować maksymalnie do 7 dni.
Produkt do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu, w przypadku otwartych, sączących się ran, u dzieci poniżej 3. roku życia, do innych otworów ciała, np. oka, nosa.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania wyrobu i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W razie kontaktu z oczami obficie przemyć wodą.

Kobiety w ciąży przed zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza.

U dzieci stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25 stopni C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Skład: Woda, gliceryna, karboksymetylochitozan, hialuronian sodu, srebro.

Opakowanie: 50 ml