

Naranyl Żel przyspieszający gojenie ran - 15g

Cena: 25,30 pln



Opis słownikowy

Producent	Novascon
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Wyrób medyczny NARANYL Żel tworzący na skórze naturalny opatrunek, który chroni ranę przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych i zapewnia jej właściwy poziom nawilżenia.

Dzięki zawartości srebra koloidalnego preparat zyskuje silne właściwości antyseptyczne i antybakteryjne, karbomer wpływa na odpowiednie nawilżenie skóry, a kwas hialuronowy, występujący powszechnie w wielu tkankach ciała, zapewniając napięcie, trofizm i elastyczność tkanek wspomaga i przyspiesza proces regeneracji naskórka, szybsze gojenie ran i mniej widoczną bliznę.

Głównym składnikiem produktu jest organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów - chitozan, tworzący na powierzchni skóry chroniącą przed zakażeniem i wnikaniem drobnoustrojów warstwę ochronną. Żel stymuluje proces regeneracji skóry oraz skuteczną absorpcję wysięku hamując jednocześnie krwawienie.

Wskazania:

- wspomagająco w leczeniu drobnych ran (skaleczenia, zadrapania, pęknięcia skóry, otarcia),
- w odleżynach I i II stopnia (gdzie nie dochodzi do przerwania ciągłości skóry),
- w oparzeniach I stopnia.

Skład:

Woda, polietyleoglikol 400, karboksymetylochitozan, karbomer, hialuronian sodu, srebro.

Stosowanie:

Przed każdym użyciem umyć dłonie i oczyścić i zdezynfekować zranione miejsce.

Cienką warstwę żelu nakładać na leczony obszar, tak aby końcówka aplikatora nie dotykała zranionej skóry.

W razie potrzeby można nałożyć plaster lub bandaż.

Stosować 2-3 razy dziennie po 2-4 dawki w zależności od potrzeb.

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego. Stosować maksymalnie do 7 dni.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub odczucia, że działanie wyrobu medycznego jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie stosować:

- w przypadku stwierdzonej wcześniej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu
- na rany otwarte i sączące się
- u dzieci poniżej 3. roku życia
- do innych otworów ciała np. oka, nosa, w razie kontaktu preparatu z oczami obficie przemyć wodą

Dodatkowe informacje:

Kobiety w ciąży przed zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza. U dzieci stosować pod nadzorem osoby dorosłej.

W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych lub innych objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania wyrobu i w razie konieczności skonsultować się z lekarzem. O wszystkich działaniach niepożądanych należy poinformować wytwórcę.

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25 stopni C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Opakowanie: 15 g